MRT Zwerchfell Endometriose

Protokoll Dr. Alt


Sequenzen bitte an jeweiliges Gerät qualitativ adaptieren.


Die sagittalen Aufnahmen erfassen das Zwerchfell unabhängig von der Inspirationstiefe am Besten (dome-shaped), axial und coronal können aufgrund des Schichtverlaufes parallel zum Zwerchfell ggf. kleine Befunde nicht erkannt bzw. abgebildet werden.

Sequenzname	Schichtdicke	FOV / Abdeckung	Kippung / Planung
Cor FIESTA ASPIR BH	**3–4 mm**	gesamtes Zwerchfell einschließlich der Ausläufer; basale Lungenabschnitte mit erfassen.	Körperachse
Ax FIESTA ASPIR BH OB / T2 SSH (SPAIR) TRA OB	**3-4 mm**	gesamtes Zwerchfell einschließlich der Ausläufer; basale Lungenabschnitte mit erfassen; linke Nierenvene im horizontalen Crossing miterfassen	Körperachse
Sag FIESTA ASPIR BH OB	**3-4 mm**	gesamtes Zwerchfell einschließlich der Ausläufer; basale Lungenabschnitte mit erfassen.	Körperachse
Ax T1 FSE FLEX in/opp AX T1 DIXON	**3-4 mm**	gesamtes Zwerchfell einschließlich der Ausläufer; basale Lungenabschnitte mit erfassen; linke Nierenvene im horizontalen Crossing miterfassen	Körperachse

falls Weichteilbefund Rippen/Thorax im Raum steht, dann:

Sag T2 FSE PROP	**3-4 mm**	Gesamtes Zwerchfell einschließlich der Ausläufer und des Weichteilmantels	ggf. Markierung seitlich in Höhe eines Tastbefundes zur Orientierung anbringen





Stand Oktober 2026, Céline D. Alt